

УДК 595.765 (497.2)

Е. Л. Гурьева и Л. Пенев

### НОВЫЙ ВИД ЖУКОВ-ЩЕЛКУНОВ РОДА PENTHELATER ÖH. (COLEOPTERA, ELATERIDAE) ИЗ БОЛГАРИИ

Е. Л. ГУРЬЕВА и Л. ПЕНЕВ. А NEW SPECIES OF THE CLICK-BEETLE GENUS PENTHELATER ÖH. (COLEOPTERA, ELATERIDAE) FROM BULGARIA


Представители рода *Penthelater* Öh. (3 вида) были известны до сих пор только из Восточной Азии. Один экземпляр нового вида, относящегося к роду *Penthelater*, собран в Болгарии. Он был найден в ущелье, с выходами известковых пород и заросшем дубом. Ареал рода *Penthelater* — один из примеров амфинеморального дизъюнктивного ареала, столь характерного для палеарктических представителей трибы *Megapenthini*.

Новый вид назван именем собравшего его И. Василева. Голотип хранится на кафедре зоологии Софийского университета.

#### *Penthelater vassilevi* Gurjeva et Penev, sp. n.

С а м е ц. Коричнево-черный; низ, усики и ноги коричневые, верх в темном, низ в золотистом опушении. Длина 11 мм, наибольшая ширина 3.5 мм.

Голова в крупных пупковидных точках, промежутки между которыми меньше поперечника точки или равны ему. Усики не доходят до вершин задних углов переднеспинки на длину двух члеников; 2-й членик имеет равные длину и ширину; 3-й примерно в 1.5 раза длиннее 2-го; пропорции следующих члеников более или менее одинаковы, но к вершине усиков членики становятся мельче, их длина в 1.8 раза больше ширины на вершине.



*Penthelater vassilevi* sp. n., вершина VIII сегмента брюшка и эдеагуса.

Переднеспинка имеет равные длину и ширину, почти параллельносторонняя; срединная бороздка отсутствует; пунктировка пупковидная, слабо неравномерная, на боках промежутки меньше точки, кое-где равны ей, на диске равны точке и больше ее, на заднем скате равны 2—3 точкам. Проплевры в крупных простых точках, промежутки между которыми у переднего края равны точке и меньше ее, у заднего края равны 1—3 точкам, очень неявственно шагреневаны. Стернит переднегруди в крупных круглых точках, промежутки между ними меньше поперечника точки или равны ей. Длина щитка примерно в 2 раза больше его ширины у основания.

Надкрылья в 2.8 раза длиннее переднеспинки, наиболее широкие у плеч; бороздки глубокие, ямки в них глубокие, круглые, не превышающие ширину бороздки; междуядья едва выпуклые, на переднем скате в крупных бугорках, у вершины в редких крупных точках. Заднегрудь в крупных круглых, брюшко в овальных простых точках. Гениталии — см. рисунок. Самка неизвестна.

М а т е р и а л. 1♂: Болгария, Плевен, Реселец, 19 VII 1981 (И. Василев).

Новый вид очень близок к *P. plebejus* (Cand.), хорошо от него отличается строением усиков (они чуть короче, 2-й членик почти шаровидный), формой переднеспинки, скульптурой проплевры и стернита переднегруди, формой щитка, имеющего более закругленную вершину, и строением эдеагуса, пенис которого почти параллельносторонний, а параметры чуть более широкие.

Зоологический институт АН СССР, Ленинград  
и Софийский университет, Болгария.